Banco de Germoplasma de Peral y Manzano de la Universidad de Lleida
Caracterización - Peral

Número de accesión: P-140

Denominación:	**Navalmoral de Béjar - 2**
Origen:	Navalmoral de Béjar (Salamanca)
Latitud:	40° 24' N
Longitud:	5° 46' W
Altitud:	810 m
Fecha de recolección:	2004 (1999)
Donante:	Facilitada por D. Bernabé Cascón Nogales

ARBOL Y RAMIFICACIÓN

1	Árbol, vigor:	Medio
2	Árbol, ramificación:	Media
3	Árbol, porte:	Semierecto
4	Ramo, forma de crecimiento:	En zig zag
5	Ramo, longitud del entrenudo:	Corta
6	Ramo, color predominante:	Marrón rojizo
7	Ramo, número de lenticelas:	Pequeño
8	Ramo, forma del ápice de la yema:	Agudo
9	Ramo, posición de la yema vegetativa en relación con el ramo:	Ligeramente divergente
10	Ramo, tamaño del soporte de la yema:	Medio
11	Brote, pigmentación antociánica del ápice en crecimiento:	Media
12	Brote, intensidad de la pubescencia:	Fuerte
110	Ramo, grosor:	Grueso
111	Ramo, relación longitud/grosor de los entrenudos:	Pequeña

HOJAS

13	Limbo, porte con relación al ramo:	Horizontal
14	Limbo, longitud:	Largo
15	Limbo, anchura:	Ancho
16	Limbo, relación longitud/anchura:	Media
17	Limbo, forma de la base:	Cordiforme
18	Limbo, forma del ápice:	Aguda
19	Limbo, longitud de la punta:	Larga
20	Limbo, forma del borde:	Lisa
21	Limbo, profundidad de las incisiones del borde:	---
22	Limbo, curvatura del eje longitudinal:	Media
23	Peciolo, longitud:	Medio
24	Peciolo, presencia de estípulas:	Presentes
25	Peciolo, distancia de las estípulas a la inserción basal del peciolo:	Pequeña
130	Limbo, curvatura longitudinal de la hoja:	Hiponástico
131	Limbo, curvatura transversal de la hoja:	Cóncava
132	Limbo, aspecto de la superficie:	Medianamente brillante
133	Peciolo, ángulo del peciolo respecto al ramo:	Mediano

FLORES (incluye yemas fructíferas)

26	Yema fructífera, situación:	Sin predominio
27	Yema fructífera, longitud:	Larga
28	Flor - sépalos, longitud:	Media
29	Flor - sépalos, porte de los sépalos en relación con la corola:	Recurvado
30	Flor - pétalos, posición de los bordes de los pétalos:	Solapados
31	Flor - estilos, posición de los estigmas en relación con los estambres:	Por encima
32	Flor - pétalos, tamaño del pétalo:	Medio
33	Flor - pétalos, forma excluida la uña:	Ovalado ancho
34	Flor - pétalos, forma de la base del pétalo excluida la uña:	Truncada
35	Flor - pétalos, longitud de la uña del pétalo:	Media
120	Inflorescencia, número medio de flores:	Numerosas
121	Flor, tamaño:	Grande
122	Receptáculo, pubescencia:	Ligeramente pubescente
123	Pétalos, número de pétalos:	Ligeramente superior a 5
124	Pétalos, ondulación del borde:	Media
125	Pétalos, longitud:	Medio
126	Pétalos, anchura:	Medio
127	Pétalos, relación longitud/anchura:	Más largos que anchos
128	Estilos, punto de soldadura:	Cerca de la base

FRUTOS

36	Fruto no maduro, color de los sépalos:	Marrón rojizo
37	Fruto, longitud:	Medio
38	Fruto, diámetro máximo (calibre):	Medio
39	Fruto, relación longitud/diámetro:	Grande
40	Fruto, posición del diámetro máximo:	Ligeramente hacia el cáliz
41	Fruto, tamaño (peso):	Grande
42	Fruto, simetría (en sección longitudinal):	Ligeramente asimétrico
43	Fruto, perfil lateral (en sección longitudinal):	Cóncavo
44	Fruto, color de fondo:	Verde amarillento
45	Fruto, zona relativa de color de superficie:	Ausente o muy pequeña
46	Fruto, tono del color de superficie:	Rojo rosado
47	Fruto, zona relativa de russeting en la cavidad del ojo:	Ausente o muy pequeña
48	Fruto, zona relativa de russeting en las caras:	Ausente o muy pequeña
49	Fruto, zona relativa de russeting en torno a la base peduncular:	Ausente o muy pequeña
50	Fruto, longitud del pedúnculo:	Media
51	Fruto, grosor del pedúnculo:	Medio
52	Fruto, curvatura del pedúnculo:	Débil
53	Fruto, porte del pedúnculo en relación con el eje del fruto:	En ángulo recto
54	Fruto, profundidad de la cavidad peduncular:	Media
55	Fruto, porte de los sépalos:	Divergentes
56	Fruto, cavidad del ojo:	Presente
57	Fruto, profundidad de la cavidad calicina:	Media
58	Fruto, anchura de la cavidad calicina:	Media
59	Fruto, relieve de la zona en torno al ojo:	Liso
60	Textura de la carne:	Gruesa

61	Dureza de la carne:	Blanda
62	Jugosidad de la carne:	Jugosa
63	Semilla, forma:	Ovalada
140	Fruto, forma:	Calabaciforme
141	Fruto, diámetro del corazón:	Medio
142	Fruto, oscurecimiento de la carne:	Débil
143	Semilla, longitud:	Grande
144	Semilla, anchura:	Muy ancha
145	Semilla, color:	Marrón oscuro

FENOLOGÍA

64	Época de inicio de floración:	Tardía
65	Época de madurez para consumo:	Media
150	Época de caída de hoja:	Tardía

CALIDAD DEL FRUTO Y TEST DE CATA

201	Peso del fruto:	Grande
202	Calibre del fruto:	Medio
203	Índice de almidón:	Bajo
204	Dureza de la carne:	Baja
205	Índice refractométrico (IR):	Alto
206	Acidez titulable:	Baja
207	Jugosidad de la carne:	Jugosa
208	Textura de la carne:	Gruesa
209	Dulzor:	Medio
210	Acidez:	Débil
211	Intensidad del sabor de la carne:	Media
212	Sabor:	Regular
213	Valoración global del fruto:	Regular

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

301	Afinidad del injerto (compatibilidad con membrillero):	Muy buena
302	Facilidad de formación y poda:	Baja
303	Precocidad varietal:	Media
304	Vecería:	Baja
305	Productividad:	Alta
306	Escalonamiento de la maduración del fruto:	Muy largo
307	Sensibilidad a la caída en maduración:	s/d
308	Aptitud para la conservación del fruto en árbol:	s/d
309	Aptitud para la conservación del fruto en almacén o cámara:	s/d
310	Sensibilidad al moteado:	s/d
311	Sensibilidad al oídio:	s/d
312	Sensibilidad a pulgones:	s/d
313	Sensibilidad a psila:	Alta
314	Sensibilidad al socarrado de hojas:	Media

Número de accesión: P-140 **Denominación: Navalmoral de Béjar - 2**

Flor:

Hoja:

Fruto: